

**Key Properties**

Atomic Mass	18.998
Category	Halogens
State at 20°C	gas
Melting Point	-219.67°C
Boiling Point	-188.11°C
Density	1.696 g/L
Electron Config	[He] 2s22p5
Electronegativity	3.98
Year Discovered	1886
Discovered By	Henri Moissan

**Did You Know?**

- हे सर्व रासायनिक घटकांपैकी सर्वात इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आणि सर्वात प्रतिक्रियाशील आहे; ते इतके प्रतिक्रियाशील आहे की ते क्वीननसारख्या उदात्त वायूसह संयुगे देखील तयार करू शकते.
- फ्लोरिन वायू इतका आक्रमक असतो की तो काच आणि पाणी यासारख्या पदार्थांना आग लावू शकतो.
- ते वेगळे करणे आश्चर्यकारकपणे कठीण होते; 1886 मध्ये अखेरीस हेन्री मोईसन यशस्वी होण्यापूर्वी रसायनशास्त्रज्ञांना 74 वर्षे सतत प्रयत्न करावे लागले, ज्यासाठी त्यांना नोबेल पारितोषिक मिळाले.
- नॉन-स्टिक कोटिंग टेफ्लॉन हे कार्बन आणि फ्लोरिन अणू (पॉलीटेट्राफ्लुरोइथिलीन) पासून बनवलेले पॉलिमर आहे.
- हायड्रोफ्लोरिक ॲसिड (एचएफ), पाण्यातील हायड्रोजन फ्लोराइडचे द्रावण, काच विरघळू शकणाऱ्या काही पदार्थांपैकी एक आहे.

**APPEARANCE**

फिकट गुलाबी, संक्षारक, पिवळा-हिरवा वायू.

**SUPERHERO PERSONA**

"संक्षारक कुसेडर, सर्वात प्रतिक्रियाशील आणि आक्रमक नायक, जो जवळजवळ कोणाशीही बंधन घालू शकतो."

**EVERYDAY CONNECTION**

तुमच्या दूधपेस्टमधील फ्लोराईड तुमच्या दातांचे संरक्षण करते.

**POP CULTURE**

फ्लोरिनपासून मिळणारे हायड्रोफ्लोरिक ॲसिड, 'ब्रेकिंग बॅंड'मध्ये शरीर विरघळण्यासाठी प्रसिद्ध आहे.

**फ्लोरिनचा आढावा**

फ्लोरिन हा फिकट पिवळ्या-हिरव्या रंगाचा वायू आहे आणि आवर्त सारणीतील सर्वात प्रतिक्रियाशील घटक आहे. अणुक्रमांक 9 असल्याने, तो जवळजवळ इतर सर्व पदार्थांशी हिंसकपणे प्रतिक्रिया देतो - त्याच्या उपस्थितीत स्टील लोकर देखील ज्वालामध्ये फुटते. या अत्यंत प्रतिक्रियाशीलतेमुळे, फ्लोरिन निसर्गात त्याच्या शुद्ध स्वरूपात कधीच आढळत नाही, परंतु त्याची संयुगे उद्योग आणि दैनंदिन जीवनात व्यापक आणि अत्यंत महत्त्वाची आहेत.

**फ्लोरिनचे उपयोग**

त्याच्या धोकादायक स्वरूपा असूनही, फ्लोरिनची प्रतिक्रियाशीलता त्याला अनेक आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधारस्तंभ बनवते:

अणुऊर्जा: फ्लोरिनचा वापर युरेनियम हेक्साफ्लोराइड (UF<sub>6</sub>) तयार करण्यासाठी केला जातो, जो अणुइंधन उत्पादनात युरेनियम समस्थानिक वेगळे करण्यासाठी आवश्यक आहे.

उच्च-कार्यक्षमता प्लास्टिक: फ्लोरिन-आधारित संयुगे टेफ्लॉन (PTFE) चा आधार आहेत, जो स्वयंपाक भांड्यांमध्ये त्याच्या नॉन-स्टिक गुणधर्मासाठी ओळखला जातो. PTFE केबल इन्सुलेशन, रासायनिक-प्रतिरोधक कोटिंग्ज आणि गोर-टेक्स सारख्या जलरोधक कापडांमध्ये देखील वापरला जातो.

इलेक्ट्रॉनिक्स: फ्लोरिनपासून मिळवलेले सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF<sub>6</sub>), उच्च-व्होल्टेज ट्रान्सफॉर्मर आणि इलेक्ट्रिकल उपकरणांमध्ये इन्सुलेट गॅस म्हणून वापरले जाते.

काचेचे खोदकाम: हायड्रोफ्लोरिक ॲसिड (HF) सिलिकेट्स विरघळवते आणि लाईट बल्ब, लेन्स आणि प्रयोगशाळेतील उपकरणांसाठी काचेचे खोदकाम करण्यासाठी वापरले जाते.

रेफ्रिजरंट्स: CFCs (क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स) सारखे फ्लोरिन संयुगे एकेकाळी रेफ्रिजरेशन आणि एरोसोलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात होते. जरी आता ओझोन थराला नुकसान पोहोचवण्यासाठी बंदी घातली असली तरी, सुरक्षित फ्लोरिनेटेड पर्याय अजूनही वापरात आहेत.

**फ्लोरिनची जैविक भूमिका**

फ्लोरिन हा मुक्त घटक म्हणून विषारी आहे, परंतु त्याचे आयन स्वरूप, फ्लोराइड (F<sup>-</sup>), जीवशास्त्रात महत्त्वाचे आहे:

दंत आरोग्य: फ्लोराइड दातांच्या मुलामा चढवणे मजबूत करते आणि पोकळी टाळण्यास मदत करते. अनेक प्रदेशांमध्ये, या कारणास्तव पिण्याच्या पाण्यात कमी प्रमाणात मिसळले जाते.

हाडे: फ्लोराइड हाडांच्या मजबुतीमध्ये योगदान देते, जरी जास्त प्रमाणात सेवन केल्याने फ्लोरोसिस होऊ शकतो.

मानवांमध्ये: शरीरात सुमारे २-३ मिलीग्राम फ्लोराईड असते, प्रामुख्याने हाडे आणि दातांमध्ये.

**फ्लोराईडची नैसर्गिक घटना आणि उत्पादन**

फ्लोराईड हे पृथ्वीच्या कवचात १३ वे सर्वात मुबलक घटक आहे. ते फ्लोराईट (CaF<sub>2</sub>) आणि क्रायोलाइट (Na<sub>3</sub>AlF<sub>6</sub>) सारख्या खनिजांमध्ये आढळते.

व्यावसायिक फ्लोराईड हायड्रोफ्लोराईड आम्लामध्ये विरघळलेल्या पोटॅशियम हायड्रोजेनडिफ्लोराईड (KHF<sub>2</sub>) च्या इलेक्ट्रोलिसिसद्वारे तयार केले जाते, ही पद्धत प्रथम ते वेगळे करण्यासाठी वापरली जात होती.

**फ्लोराईडचा इतिहास**

१८१२ - नामकरण: फ्रेंच शास्त्रज्ञ आंद्रे-मेरी ॲंपेरे यांनी फ्लोराईड खनिजापासून फ्लोराईड हे नाव दिले.

१९ व्या शतकातील आढावे: हम्फ्री डेव्हीसह अनेक रसायनशास्त्रज्ञांनी फ्लोराईड वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्याच्या विषारीपणामुळे ते आजारी पडले.

१८८६ - पहिले आयसोलेशन: फ्रेंच रसायनशास्त्रज्ञ हेन्री मोइसन यांनी द्रव हायड्रोफ्लोरिक आम्लात विरघळलेले पोटॅशियम बायफ्लोराइड इलेक्ट्रोलायझ करून यशस्वी केले. त्यांच्या या कामगिरीमुळे त्यांना १९०६ चे रसायनशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक मिळाले.

thepredictable.in