

85  
**At**  
Astatine  
[210]

**Key Properties**

Atomic Mass	[210]
Category	Halogens
State at 20°C	solid
Melting Point	300°C
Boiling Point	350°C
Density	7.0*
Electron Config	[Xe] 4f145d106s26p5
Electronegativity	2.2
Year Discovered	1940
Discovered By	Dale R. Corson, Kenneth R. MacKenzie & Emilio Segrè

**Did You Know?**

- 1 ఇది భూమి యొక్క క్రస్ట్లో సహజంగా లభించే అరుదైన మూలకం. ఏ క్షణంలోనైనా మొత్తం గ్రహం మీద ఒక గ్రాము కంటే తక్కువ అస్టాటిన్ ఉన్నట్లు అంచనా వేయబడింది.
- 2 దీని పేరు గ్రీకు పదం 'అస్టాటోస్' నుండి వచ్చింది, దీని అర్థం 'అస్థిరమైనది', దీని అన్ని ఐసోటోప్లు అధిక రేడియోధార్మికత కలిగి ఉండటం వలన సముచితం.
- 3 ఇది ఒక హాలోజన్, మరియు దాని లక్షణాలు అయోడిన్తో సమానంగా ఉంటాయని అంచనా వేయబడింది, అయితే ఇది చాలా రేడియోధార్మికతతో అధ్యయనం చేయడం కష్టం.
- 4 తగినంతగా సేకరించగలిగితే, అది నలుపు లేదా ముదురు లోహ ఘన రూపంలో కనిపిస్తుంది.
- 5 క్యాన్సర్ చికిత్సకు లక్ష్యంగా ఉన్న ఆల్ఫా-పార్టికల్ థెరపీలో సంభావ్య ఉపయోగం కోసం శాస్త్రవేత్తలు దాని రేడియోధార్మిక ఐసోటోప్లను అధ్యయనం చేస్తున్నారు.

**APPEARANCE**

అస్టాటిన్ అధిక రేడియోధార్మిక హాలోజన్.

**SUPERHERO PERSONA**

"ఘోస్ట్, భూమిపై అత్యంత అరుదైన హీరో, చాలా అస్థిరంగా ఉంది, అది కనిపించిన వెంటనే అదృశ్యమవుతుంది."

**EVERYDAY CONNECTION**

అస్టాటిన్కు దాని అత్యంత అరుదైన కారణంగా రోజువారీ సంబంధం లేదు.

**POP CULTURE**

అస్టాటిన్ అనేది అత్యంత అరుదైన సహజ మూలకం --- ఏ సమయంలోనైనా భూమిపై ఒక గ్రాము కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.

**అస్టాటిన్ యొక్క అవలోకనం**

అస్టాటిన్ అనేది సహజంగా లభించే అత్యంత అరుదైన హాలోజన్ మరియు ఆవర్తన పట్టికలో అత్యంత అస్పష్టమైన మూలకాలలో ఒకటి. ఇది ప్రమాదకరమైన రేడియోధార్మికత, మరియు దాని అత్యంత స్థిరమైన ఐసోటోప్ అయిన అస్టాటిన్-210 కూడా కేవలం 8 గంటల సగం జీవితాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ తీవ్ర అస్థిరత కారణంగా, అస్టాటిన్ కనిపించే మొత్తంలో వేరుచేయడం అసాధ్యం మరియు తక్కువగా అధ్యయనం చేయబడిన మూలకాలలో ఒకటిగా మిగిలిపోయింది. రసాయనికంగా, ఇది అయోడిన్ వంటి ఇతర హాలోజన్లను పోలి ఉంటుంది.

**అస్టాటిన్ అధ్యయనం చేయడం ఎందుకు కష్టం**

అస్టాటిన్ యొక్క స్వల్ప అర్ధ-జీవితకాలం మరియు బలమైన రేడియోధార్మికత ప్రయోగాలను కష్టతరం చేస్తాయి. దీనికి శాస్త్రీయ పరిశోధనకు మించి ఆచరణాత్మక అనువర్తనాలు లేవు. ప్రయోగశాల అధ్యయనాలు దాని రసాయన ప్రవర్తన అయోడిన్ను ప్రతిబింబిస్తుందని చూపిస్తున్నాయి, అయితే ఈ లక్షణాలను కొలవడానికి మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ వంటి అత్యంత సున్నితమైన పద్ధతులు అవసరం. ఆవర్తన పట్టిక యొక్క బరువైన చివరలో హాలోజన్ సమూహం యొక్క ధోరణులను బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి పరిశోధకులు ప్రధానంగా అస్టాటిన్ను అధ్యయనం చేస్తారు.

**అస్టాటిన్ చరిత్ర**

సమీప ఆవిష్కరణలు (1939): ఖనిజాలలో కొత్త మూలకం యొక్క ఆధారాలను రెండు సమూహాలు నివేదించాయి. హెరీయో హులుబీ మరియు యెట్ కోచ్మ్యాన్ మూలకం 85కి అనుగుణంగా ఉన్న ఎక్స్-రే సమూహాలను గమనించగా, వాల్టర్ మైండర్ రసాయన పరీక్షలను ఉపయోగించారు. ఈ రెండు వాదనలను నిశ్చయాత్మకంగా అంగీకరించలేదు.

ధృవీకరించబడిన సంశ్లేషణ (1940): కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయంలో, డేల్ ఆర్. కోర్సన్, కె.ఆర్. మెకెంజీ మరియు ఎమిలియో సెగ్రే బిన్సెట్ను ఆల్ఫా కణాలతో పేల్చడం ద్వారా అస్టాటిన్ను విజయవంతంగా సృష్టించారు, ఇది దాని ఉనికికి మొదటి నమ్మకమైన రుజువును అందించింది.

రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ఆలస్యం: రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం మరియు మాన్హట్టన్ ప్రాజెక్ట్ వ్యాప్తి పరిశోధన ప్రాధాన్యతలను మార్చింది, మూలకం యొక్క తదుపరి అధ్యయనాన్ని నెమ్మదిస్తుంది.

**అస్టాటిన్ యొక్క సహజ సంభవం మరియు ఉత్పత్తి**

వేగవంతమైన క్షయం కారణంగా అస్టాటిన్ భూమిపై కొలవగల పరిమాణంలో లేదు. ఇది యురేనియం మరియు థోరియం ఖనిజాలలో శ్రేస్ మొత్తంలో సంభవిస్తుందని భావిస్తున్నారు, కానీ ఏ సమయంలోనైనా మొత్తం సహజ సరఫరా మొత్తం గ్రహం అంతటా ఒక గ్రాము కంటే తక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేయబడింది.

పరిశోధన కోసం, అణు రియాక్టర్లో బిస్మత్-209ని ఆల్ఫా కణాలు లేదా న్యూట్రాన్లతో బాంబు దాడి చేయడం ద్వారా అస్టాటిన్ కృత్రిమంగా ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది, ఇది స్వల్పకాలిక ప్రయోగాలకు అనువైన ఐసోటోపులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

**అస్టాటిన్ యొక్క జీవ పాత్ర**

అస్టాటిన్కు ఎటువంటి జీవసంబంధమైన పనితీరు లేదు. దాని తీవ్రమైన రేడియోధార్మికత కారణంగా ఇది చాలా విషపూరితమైనది మరియు దాని అస్థిరత జీవన వ్యవస్థలలో ఎటువంటి సహజ పాత్ర పోషించకుండా నిరోధిస్తుంది.